



Cancer colon et rectum, stade TNM

Accueil / Scores et outils / Cancérologie

T Tumeur

Tx Tumeur primitive non évaluable

T0 Pas de tumeur primitive

Tis Envahissement de l'épithélium ou de la lamina propria

T1 Envahissement de la sous-muqueuse

T2 Envahissement de la musculieuse

T3 Envahissement de la sous-séreuse ou des tissus péricolo-rectaux non péritonisés

Atteinte de la séreuse ou des structures adjacentes
T4 T4a : perforation du péritoine viscéral
T4b : adhésion ou invasion d'un organe de voisinage

N Ganglion

Nx Ganglions non évalués

N0 Pas de métastase ganglionnaire régionale

1 à 3 ganglions métastatiques régionaux
N1a : 1 ganglion métastatique
N1b : 2 ou 3 ganglions métastatiques
N1c : nodule(s) tumoraux, c-à-d satellite(s) dans la sous-séreuse, ou dans les tissus non péritonéalisés péricoliques ou périrectaux sans métastase ganglionnaire régionale

4 ou plus ganglions métastatiques régionaux
N2 N2a : 4 à 6 ganglions métastatiques
N2b : 7 ou plus ganglions

M Métastase

M0 Pas de métastase

M1 Métastases à distance

M1 a : Métastase localisée à un seul organe (foie, poumon, ovaire, ganglion(s) lymphatique(s), autre que régional

M1b Métastases dans plusieurs organes ou péritonéales

AJCC, 7ème édition, 2010

[Gonococcie – Vincent de Parades – JFHOD 2015](#)