PDAI – (Perineal Disease Activity Index) (score de Hughes)

Accueil / Scores et outils / Maladies inflammatoires

Le Perineal Disease Activity Index (PDAI) permet grâce à 5 paramètres d'interrogatoire et d'examen de quantifier la sévérité de la maladie. Il évalue la productivité d'une fistule, la présence d'une douleur et de son retentissement sur l'activité.

Usual therapy improves perianal Crohn's disease as measured by a new disease activity index.

Irvine EJ McMaster IBD Study Group. J Clin Gastroenterol. 1995; 20: 27-32.

SNFCP
Société Nationale Française de
Colo-Proctologie

PDAI

Nom :
Date :

Suintement/écoulement : ⌊ ⌋

0 = Aucun
1 = Minime suintement muqueux
2 = Suintement muqueux ou puriforme modéré
3 = Suintement important
4 = Écoulement fécal important

Douleur/limitation des activités : ⌊ ⌋

0 = Aucune
1 = Inconfort modéré, pas de limitation des activités
2 = Inconfort moyen, limitation des activités
3 = Inconfort marqué, limitation partielle des activités
4 = Douleur importante, limitation importante

Limitation des activités sexuelles : ⌊ ⌋

0 = Aucune
1 = Restriction légère
2 = Limitation modérée
3 = Limitation marquée
4 = Activité sexuelle impossible

Type d'atteinte périnéale : ⌊ ⌋

0 = Aucune ou simples marisques
1 = Fissure ou coupure anale
2 = <3 fistules anales
3 = ≥3 fistules anales
4 = Ulcération atteignant le sphincter anal ou fistule avec important décollement cutané

Degré d'induration : ⌊ ⌋

0 : Aucune
1 : Induration minime
2 : Induration modérée
3 : Induration importante
4 : Zone fluctuante/abcès

TOTAL PDAI=⌊ ⌋