



Ano-rectite radique chronique

- De survenue parfois retardée, plusieurs années après l'irradiation (rectum, anus, prostate)
- Localisée sur la marge anale elle est peu symptomatique : télangiectasies, peau +/- cartonnée
- Localisée au rectum elle peut être responsable de saignements importants avec anémie



Dr Nadia Fathallah



Dr Nadia Fathallah

Éléments clés

- Evaluer l'importance du saignement et rechercher une anémie
- Evaluer et traiter les troubles du transit associés qui peuvent aggraver les saignements
- Rechercher les traitements (anticoagulants) qui peuvent aggraver les saignements

Gravité

- Possible anémie profonde

Examens complémentaires

- Recto/Coloscopie

Grandes lignes du traitement

- | | | |
|----------------|---------------------|---|
| ✓ Urgence | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | Selon l'anémie |
| ✓ Médical | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | Régulateurs du transit |
| ✓ Endoscopique | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | Coagulation plasma Argon, application de formol |



Aspect post coagulation au Plasma Argon
Dr Richard Beyssac