



# Prolapsus hémorroïdaire Interne thrombosé

- Tuméfaction circonférentielle excessivement douloureuse, aiguë, souvent au décours d'un effort de poussée important (accouchement, trouble du transit)
- Peut être associée à des rectorragies canalaires, un suintement permanent dans les sous-vêtements et parfois fièvre (secondaire à l'inflammation)
- Prolapsus extériorisé circonférentiel des paquets hémorroïdaires internes qui sont thrombosés et inflammatoires



## Éléments clés

- La tuméfaction inflammatoire est recouverte de muqueuse ce qui la distingue de la thrombose des hémorroïdes externes
- Ne pas confondre avec une suppuration à drainer en urgence
- Ne pas inciser (risque de saignement et de douleurs)
- Contre-indication aux AINS pendant la grossesse (mais pas au cours de l'allaitement)

## Gravité

- Prise en charge médicale de la douleur rapidement, nécessitant parfois un traitement par voie intraveineuse

## Examens complémentaires

- Aucun



- |   |             |           |  |
|---|-------------|-----------|--|
| ✓ | Médical     | ■ ■ ■     | AINS (ou corticoïdes si survient au cours d'une grossesse), Antalgique<br>De pallier 2 ou 3, toilettes douces, application de topiques<br>(éventuellement anesthésiques ou cortisonés), laxatifs +++ |
| ✓ | Chirurgical | ■ ■ ■ ■ ■ | Rarement hémorroïdectomie de Milligan et Morgan si échec d'un<br>traitement médical bien conduit   |